

Functional assessment staging test

Stage	臨床診断	特徴	期間	精神年齢 (歳)	MMSE (点)
1	正常	自覚的にも他覚的にも機能低下はない		成人	29~30
2	正常な高齢者	自覚的な機能低下はあるが、複雑な職業的あるいは社会的活動場面で客観的な能力の低下はない			28~29
3	境界域	複雑は職業的あるいは社会的作業を阻害する程度の客観的な機能低下はある	7年	12以上	24~28
4	軽度のAD	日常生活における複雑な仕事を遂行する能力の低下がある 夕食会の企画、買い物、家計管理などがうまくできない	2年	8~12	19~20
5	中等度のAD	日常生活における基本的な仕事、例えば適切な衣服の選択などを行う能力の低下がある	18カ月	5~7	15
6	やや高度のAD	着衣、入浴、排泄などを独力で行う能力の低下がある			
a		衣服を正しく着用できない	5カ月	5	9
b		入浴に介助が必要、入浴を怖がる	5カ月	4	8
c		水洗トイレがうまく使えない	5カ月	4	5
d		尿失禁をする	4カ月	3~4	3
e		便失禁をする	10カ月	2~3	1
7	高度のAD	会話、移動能力、意識の消失がある			
a		語彙は6単語以下になる	12カ月	1.25	0
b		使用しうる語彙は1単語のみになる	18カ月	1	0
c		移動能力が失われる	12カ月	1	0
d		座位を保てなくなる	12カ月	0.5~0.8	0
e		笑えなくなる	18カ月	0.2~0.4	0
f		頭部を支えられなくなる、混迷、昏睡	不定	0~0.2	0

AD : Alzheimer' s disease

文献1を改変された文献2より引用

文献1 : Auer S & Reisberg B :The GDS/FAST staging system. Int Psychogeriatr, 9 Suppl 1 :167-171, 1997

文献2 : MEDICAL CARE CORPORATION:Functional Assessment Staging Test

<http://www.mccare.com/pdf/fast.pdf>